


# モビプレップの 服用について




# 溶解のしかた



1


作る直前にアルミの袋を開封してください

# 溶解のしかた



**2** バッグのキャップを開けて  
★の目印まで常温の水をいれてください。

# 溶解のしかた




**3 キャップをしっかりと閉めて、  
A剤とB剤の隔壁を開通させます。**

# 溶解のしかた



3 キャップをしっかりと閉めて、  
A剤とB剤の隔壁を開通させます。


# 溶解のしかた



4

バッグをよく振り粉末を溶かしてください。


# 溶解のしかた



5

平らな場所におき、2リットルの目盛り線まで  
さらに水を入れ、キャップを閉め、  
よく振り混せて完全に溶解してください。


# 溶解のしかた



5

平らな場所におき、2リットルの目盛り線まで  
さらに水を入れ、キャップを閉め、  
よく振り混せて完全に溶解してください。

# 溶解のしかた



6

前日夜にモビプレップを溶かした場合は、必ず冷蔵庫に保管してください。

# 服用のしかた

モビプレップを2杯飲んだら  
水かお茶を1杯以上飲みましょう

コップ1杯(約180ml)を  
10分かけて飲んでください

# 服用のしかた

ステップ

1

モビプレップ



(10分)



(10分)

+

水



# 服用のしかた

ステップ

2

モビプレップ



水

ここまで飲んでも1度も排便がなければ  
トイレに座ってみてください。  
それでも出ない時はお電話ください。

(10分)

(10分)

# 服用のしかた

ステップ

**3**

モビプレップ



(10分)



(10分)

+

水



# 服用のしかた

ステップ

4

モビプレップ

水



必ずステップ4までは  
飲んでください

(10分)

(10分)

1  
杯

# 服用のしかた

便がきれいにならない場合は同じ手順で  
**ステップ5・6と進んでください**

モビプレップ



(10分)



(10分)

+

水




# 便が ④ の状態になれば 検査が受けられます

前半

後半

1



2




3



4

透明感のある  
液体の状態

# 検査当日



腸管洗浄剤を服用しながら  
お通じを良くするために体を動かしてください。



残った  
モビプレップは  
必ず持ってきて  
ください

# 次の症状があらわれた方は 服用を中止しご連絡ください

- ▶ 気分が悪い
- ▶ 吐き気がする
- ▶ 吐いた
- ▶ お腹が痛い
- ▶ 顔が青ざめる
- ▶ めまいがする
- ▶ 寒気がする
- ▶ 顔がむくむ
- ▶ 息苦しい
- ▶ じんましんが出る  
など

# 服用中に飲んでもよい水分



服用前後または服用中にも、  
のどが渴いた場合には  
**水、またはお茶**であれば  
飲むことは可能です。

**水** …ミネラルウォーターも可

**お茶**…煎茶、番茶、ウーロン茶、麦茶、  
紅茶※砂糖・ミルクは使用不可

ご不明点等ありましたら  
スタッフへお声がけ下さい